

## **Льняная плодоярка**

**На посевах льна начала вредить Льняная плодоярка (*Phalonia epilina* Zell.).**

Бабочка молевидная небольших размеров, размах крыльев 14-16 мм; передние крылья желтоватого цвета с широкой коричневой каймой по наружному краю и узкой поперечной полосой по середине, задние крылья одноцветно-серые, бахромчатые. Гусеница желто-зеленая или бледно-розовая, длиной до 8 мм.

Гусеницы льняной плодоярки питаются в коробочках льна семенами, выедая частично и перегородки, выгрызают изнутри круглые летные отверстия, прикрытые внешней кожицей. Они могут также повреждать бутоны и цветки, пазушную почку того листа, где они вышли из яиц, верхушку растения и минировать стебель.

Потери урожая семян в результате повреждений гусеницами льняной плодоярки могут достигать 40 %-.

### **Меры борьбы.**

В период бутонизации и образования коробочек посевы льна обрабатывают инсектицидами: Бинадин, Данадим (д.в. диметоат, 400 г/л), Вантекс (д.в. Гамма-цигалотрин, 60 г/л), Новактион (д.в. малатион, 440 г/л) и др.

**Ремесло Е.В.**, научный сотрудник отдела  
интродукции и технологий в полеводстве и животноводстве